

Harvinaiset diagnoosit

Useimmat harvinaisista sairauksista voivat sisältää monenlaisia oireita, ja ne voivat esiintyä eri puolella kehoa. Siksi diagnoosikuvauksissa käydään läpi sairauden mahdollisia eri muotoja ja oireita.

Vaikka kahdella henkilöllä olisikin sama diagnoosi, sairauden kulku on aina yksilöllinen. Toisella voi olla vain muutamia lieviä oireita, kun taas toisella voi olla hyvin aktiivinen sairaus ja paljon erilaisia oireita. Aktiivisen vaiheen jälkeen voi tulla pitkä oireettomampi jakso tai sairaus voi muuttua oireettomaksi.

Diagnoosikuvaus on tarvittaessa helppo tulostaa sivun yläreunan oranssin tulostuspainikkeen avulla.

Voit halutessasi antaa Reumaliiton harvinaiset-tiimille [palautetta diagnoosikuvauksista](#). Valitettavasti emme kuitenkaan voi antaa yksilöllistä neuvontaa sairauksista tai niiden hoidosta.

Diagnoosit

- [Antisyntetaasisyndrooma](#)
- [Behçetin oireyhtymä](#)
- [Buergerin tauti](#)
- [Coganin oireyhtymä](#)
- [Ehlers-Danlosin oireyhtymä \(EDS\)](#)
- [Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti, EGPA](#)
- [Goodpasturen oireyhtymä](#)
- [Granulomatoottinen polyangiitti, GPA](#)
- [Hankittu hyperostoosioireyhtymä](#)
- [Hypokomplementeeminen urtikariaalinen vaskuliittioireyhtymä \(HUVS\)](#)
- [IgA-vaskuliitti \(ent. Henoch-Schönleinin purppura\)](#)
- [Inklusiokappalemyosiitti, IBM](#)
- [Jättisoluarteriitti](#)
- [Kawasakin tauti](#)
- [Kryoglobulinemian vaskuliitti](#)
- [MCTD \(sekamuotoinen sidekudossairaus\)](#)
- [Okulovestibulaarinen oireyhtymä](#)
- [Polyarteritis nodosa \(PAN\)](#)
- [Relapsoiva polykondriitti \(RP\)](#)
- [SAPHO-oireyhtymä](#)
- [Schnitzlerin oireyhtymä](#)
- [Skleroderma \(Reuma-aapinen\)](#)
- [Systeeminen lupus erythematosus, SLE \(lupus\)](#)
- [Systeeminen skleroosi / skleroderma](#)
- [Takayasun arteriitti](#)
- [Temporaaliarteriitti](#)
- [Tukkotulehdus](#)

- [Tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitti](#)
- [Uusiutuva monirustotulehdus](#)
- [Valtimoiden kyhmytulehdus](#)

[Sjukdomar på svenska](#)